胃がん

レジメン名	薬剤名・投与経路	投与量	催吐リスク	日数/クール	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
CAPOX療法 20019	オキサリプラチン 点滴	130mg/㎡ 120分	中	21日間	★																			～	21														
	カペシタビン 内服	2000mg/㎡ 分2 C法			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
CAPOX+HER 療法 20020 20021	トラスツズマブ 点滴	初回8mg/kg 90分 2回目～6mg/kg 30分	中	21日間	★																			～	21														
	オキサリプラチン 点滴	130mg/㎡ 120分			★																																		
	カペシタビン 内服	2000mg/㎡ 分2 C法			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
CPT-11療法 20012	イリノテカン 点滴	150mg/㎡ 90分 B法	中	35日間	★														★																			～	35
DS療法 再発 20035	ドセタキセル 点滴	40mg/㎡ 60分	軽	21日間	★																			～	21														
	S-1 内服	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
DS療法 1～7ｸｰﾙ 20036 20037 20038	ドセタキセル 点滴 2～7ｸｰﾙのみ	40mg/㎡ 60分	軽	1～7ｸｰﾙ 21日間 8～12ｸｰﾙ 42日間	★																			～	21														
	S-1 内服 1ｸｰﾙのみ単独	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					

1ｸｰﾙ:S-1単剤(2投1休) 2～7ｸｰﾙ:ドセタキセル・S-1(2投1休)併用 8～11or12ｸｰﾙ:S-1単剤(4投2休)

DTX療法 20003	ドセタキセル 点滴	60mg/㎡ 60分	軽	21日間	★																			～	21														
mFOLFOX6 療法 20034	レボホリナート 点滴	200mg/㎡ 120分	中	14日間	★												～	14																					
	オキサリプラチン 点滴	85mg/㎡ 120分			★																																		
	フルオロウラシル 点滴	400mg/㎡ 急速			★																																		
	フルオロウラシル 点滴	2400mg/㎡ 46時間			★	→																																	
PTX療法 20002	パクリタキセル 点滴	80mg/㎡ 60分	軽	28日間	★							★							★												～	28							
PTX+RAM 療法 20023 20024	ラムシルマブ 点滴	8mg/kg 60分 30分短縮可	軽	28日間	★														★												～	28							
	パクリタキセル 点滴	80mg/㎡ 60分			★							★							★												～	28							
nab-PTX療法 20006	パクリタキセル 点滴 (ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型)	260mg/㎡ 30分	軽	21日間	★																			～	21														
weekly-nab-PTX 20031	パクリタキセル 点滴 (ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型)	100mg/㎡ 30分	軽	28日間	★							★							★												～	28							
nab-PTX+RAM 療法 20039 20040	ラムシルマブ 点滴	8mg/kg 60分 30分短縮可	軽	28日間	★														★												～	28							
	パクリタキセル 点滴 (ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型)	100mg/㎡ 30分			★							★							★												～	28							
RAM療法 20022	ラムシルマブ 点滴	8mg/kg 60分 30分短縮可	最小	14日間	★												～	14																					
SOX療法 20018	オキサリプラチン 点滴	130mg/㎡ 120分	中	21日間	★																			～	21														
	S-1 内服	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
SOX+HER 療法 20028 20029	トラスツズマブ 点滴	初回8mg/kg 90分 2回目～6mg/kg 30分	中	21日間	★																			～	21														
	オキサリプラチン 点滴	130mg/㎡ 120分			★																																		
	S-1 内服	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
SP療法 3week 20033	シスプラチン 点滴	60mg/㎡ 120分	高	21日間	★																			～	21														
	S-1 内服	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
SP療法 5week 20007	シスプラチン 点滴	60mg/㎡ 120分	高	35日間								★																										～	35
	S-1 内服	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
SP+HER 療法 20026 20027	トラスツズマブ 点滴	初回8mg/kg 90分 2回目～6mg/kg 30分	高	21日間	★																			～	21														
	シスプラチン 点滴	60mg/㎡ 120分			★																																		
	S-1 内服	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					

胃がん

レジメン名	薬剤名・投与経路		投与量	催吐リスク	日数/クール	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
XP療法 20030	シスプラチン	点滴	80mg/㎡ 120分	高	21日間	★																			～	21														
	カペシタビン	内服	2000mg/㎡ 分2 C法			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
XP+HER 療法 20004 20009 20010 20011	トラスツズマブ	点滴	初回8mg/kg 90分 2回目～6mg/kg 30分	高	21日間	★																			～	21														
	シスプラチン	点滴	80mg/㎡ 120分			★																																		
	カペシタビン	内服	2000mg/㎡ 分2 C法			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
Nivo療法 20032	ニボルマブ	点滴	240mg/Body 30分	最小	14日間	★												～	14																					