肝胆膵がん

がん種	レジメン名	薬剤名・投与経路	投与量	催吐リスク	日数/クール	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
胆道がん	GC療法 30002	シスプラチン 点滴	25mg/㎡ 120分	中	21日間	★							★												～	21							
		ゲムシタビン 点滴	1000mg/㎡ 30分			★							★																				
	GEM療法 30001	ゲムシタビン 点滴	1000mg/kg 30分	軽	28日間	★							★							★												～	28
胆道がん 膵臓がん	GS療法 30005	ゲムシタビン 点滴	1000mg/㎡ 30分	中	21日間	★							★												～	21							
		S-1 内服	80mg/㎡ 分2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
膵臓がん	FOLFIRINOX 療法 30006	オキサリプラチン 点滴	85mg/㎡ 120分	高	14日間	★												～	14														
		レボホリナート 点滴	200mg/㎡ 120分			★																											
		イリノテカン 点滴	180mg/㎡ 90分			★																											
		フルオロウラシル 点滴	400mg/㎡ 急速			★																											
		フルオロウラシル 点滴	2400mg/㎡ 46時間			★	→																										
	mFOLFIRINOX 療法 30009	オキサリプラチン 点滴	85mg/㎡ 120分	高	14日間	★												～	14														
		レボホリナート 点滴	200mg/㎡ 120分			★																											
		イリノテカン 点滴	150mg/㎡ 90分			★																											
		フルオロウラシル 点滴	2400mg/㎡ 46時間			★	→																										
	FF+nal-IRI 療法 30010 30011	イリノテカン 点滴 (リポソーム製剤)	50or70mg/㎡ 90分	中	14日間	★												～	14														
		レボホリナート 点滴	200mg/㎡ 120分			★																											
		フルオロウラシル 点滴	2400mg/㎡ 46時間			★	→																										
	GEM+nab-PTX 療法 30007	パクリタキセル 点滴 (アルブミン懸濁型)	125mg/㎡ 30分	中	28日間	★							★							★												～	28
		ゲムシタビン 点滴	1000mg/㎡ 30分			★							★							★													
肝細胞がん	ATZ+BV療法 30100	アテゾリズマブ 点滴	1200mg/Body 60分 2回目30分	最小	21日間	★																			～	21							
		ベバシズマブ 点滴	15mg/kg 90分 30分短縮可			★																											