

食道・固形がん

がん種	レジメン名	薬剤名・投与経路	投与量	催吐リスク	日数/クール	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
食道がん	DCF療法 60003	ドセタキセル 点滴	70mg/m ² 60分	高	21日間	★																																	~ 21				
		シスプラチン 点滴	70mg/m ² 120分			★																																					
		フルオロウラシル 点滴	750mg/m ² 24時間			★	★	★	★	★																																	
	DTX療法 60004	ドセタキセル 点滴	70mg/m ² 60分	軽	21日間	★																																			~ 21		
	FP療法 60001	シスプラチン 点滴	80mg/m ² 120分	高	28日間	★																																				~ 28	
フルオロウラシル 点滴		800mg/m ² 24時間	★			★	★	★	★																																		
Nivo療法 20032	ニボルマブ 点滴	240mg/Body 30分	最小	14日間	★																																				~ 14		
Pem療法 60005	ペムプロロズマブ 点滴	200mg/Body 30分	最小	21日間	★																																					~ 21	
		400mg/Body		42日間も可																																							

がん種	レジメン名	薬剤名・投与経路	投与量	催吐リスク	日数/クール	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
固形がん	※MSI-High陽性例																																										
	Pem療法 100001	ペムプロロズマブ 点滴	200mg/Body 30分	最小	21日間	★																																					
		400mg/Body		42日間も可																																							